

Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter in Mödling.

VIII. *)

55. *Hister gangeticus* Mars., nach Exempl. aus Algier beschrieben, habe ich auch aus Arragonien erhalten, wo er in wenigen Stücken von Herrn M. Korb gesammelt wurde.

56. *Airaphilus siculus* Reitt. aus Sicilien, habe ich in Südalmatien gefangen und er dürfte auch in Italien nicht fehlen.

57. Im Gebiete des caspischen Meeres kommt ein *Penthus* vor, der dem griechischen *P. tenebrioides* Walzl sehr ähnlich ist und den ich auch seinerzeit unter diesem Namen an meine Correspondenten versendet habe, der jedoch von dem andern specifisch verschieden ist. Er zeichnet sich vorzüglich durch kleinen Körper, geringeren Glanz, kürzeren Halsschild und weitläufigere Punktirung aus. Beide Arten wären etwa in nachfolgender Weise zu diagnosticiren:

Penthus brevicollis n. sp. Niger, subnitidus, antennis pedibusque rufopiceis, palpis dilutioribus, capite thoraceque dense fortiter punctatis, hoc longitudine fere latiore, lateribus valde rotundato, in medio latissimo, basin versus magis angustato, angulis posticis valde obtusis, elytris thorace plus quam duplo longioribus, fortiter aequaliterque striatis, striis 2, 3 apice parum abbreviatis, stria secunda cum septima ante apicem haud connexa, interstitiis sat dense (haud confertim) inaequaliter punctatis. Long. 11—12 mm.

Patria: Lenkoran. Von Herrn Hans Leder gesammelt.

Penthus tenebrioides Walzl. Niger, nitidus, antennis tarsisque piceis, palpis dilutioribus, capite thoraceque dense fortiter subrugose punctatis, hoc latitudine distincte longiore, lateribus ante medium leviter rotundato, basin versus angustato, angulis posticis obtusis, elytris thorace haud duplo longioribus, striatis, striis apicem versus profundioribus, stria secunda cum septima ante apicem connexa, interstitiis confertissime, fortiter aequaliterque punctatis. Long. 14 mm.

Patria: Graecia, Asia minor.

*) Siehe pag 142.